

SUSPICION D'UNE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP)

<p>Professionnel: Infirmière travaillant à l'Accueil clinique du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal</p> <p>Clientèle cible: Patient référé par un MD/IPS qui suspecte une thrombose veineuse profonde (TVP)</p> <p>Indication: Patient répond à tous les critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique (AC)</p>	<p>Critère d'inclusion spécifique: Le MD/IPS réfère a inscrit un score de Wells sur la feuille de référence</p> <p>Ordonnance: Le MD/IPS réfèrent est responsable de prescrire un NACO</p> <p>Critères d'exclusion spécifiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Température > 38,5°C - Hémorragie/ ulcère peptique dans derniers 3 Mois - Insuffisance rénale sévère (DFG < 30) 	<p>Critères d'exclusion spécifiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance hépatique sévère - Patient sous anticoagulant - Saignement actif - Thrombocytopénie < 50 X 10⁹/L - Signe d'embolie pulmonaire: Douleur rétrosternale(DRS) soudaine ou DRS ↑ sur inspiration profonde, FC ≥100bpm, RR ≥22/min, sat<92% (à moins que chronique) - Accident vasculaire cérébral récent - Usage de médicaments inhibiteurs du CYP3A4 ou de la glycoprotéine-P (ex : antiépileptiques, etc)
--	--	--

